

Overzicht complicaties transcervicale ingrepen 2018:

Ingreep	Aantal	Complicaties	
Therapeutische hysteroscopie	306	5 (1,6%)	3x perforatie 1x infectie 1x retentieblaas
Diagnostische hysteroscopie	199	1 (0,05%)	1x perforatie
HSG	247	0	
Curettagage	95	4 (4,2%)	3x bloedverlies 1x perforatie
Novasure	40	0	(2x ingreep niet mogelijk)
Totaal	887	10 (1,1%)	

Uitwerking complicaties per casus:

Therapeutische hysteroscopie:

- Placentarest 7 wkn postpartum; dilateren Hegar 8,5, darmen a vue
- Placentarest 10 wkn postpartum; dilateren Hegar 7, darmen a vue
- TCR-P; dilateren Hegar 6, darmen a vue
- TCR-M; incompleet, OK+8 myoma nascens verwijderd, daarna intra-uteriene infectie, herstel na antibiotica

Diagnostische hysteroscopie:

- Perforatie fundus

Curettagage:

- Bloedverlies 1000cc, methergin
- Bloedverlies 1200cc, methergin
- Bloedverlies 700cc, methergin, OK+3 heropname ivm ruim vbv, cavum gevuld met stolsels, met misoprostol herstel
- Perforatie fundus met zuigbuis 7, DLS: minimaal serosaletsel darm, hoeft niet overhecht